

SEPTEMBER

Vanaf nu zouden we al moeten zien wat we van de kweek terecht gebracht hebben. Het is nu aan ons om te oordelen en te noteren wat er goed en verkeerd gegaan is. Uit onze fouten moeten we willen leren. De voeding terug wat aanpassen. Van opfok wordt er langzaam overgeschakeld naar krachtvoer, dat nu nog om de twee dagen wordt gegeven. Het is nu van belang dat we onze vogels goed observeren en nagaan of er geen exemplaren tussen zitten met mindere konditie. Iedere verdachte moet onmiddellijk afgezonderd worden om mogelijke besmetting te verhinderen. Een typische najaarsziekte is de Lankesterella die de laatste tijd meer en meer voorkomt en dit vooral onder de jonge vogels (goudvink is hier heel gevoelig voor). Tekens hiervan zijn de donkerblauwe tot paarse levervlek rechts onderaan het borstbeen. In het beginstadium is deze ziekte nog goed te behandelen met ESB3 of een andere sulfamide dit gedurende een langere periode dan bij coccidiose (10 dagen sulfamide, 10 dagen lichte vitamines, 10 dagen sulfamide). De grote overbrengers van deze ziekte zijn bloedluizen die van de ene vogel op de andere overgaan en zo zorgen voor een rechtstreekse besmetting via het bloed. Aan een genezen vogel is schijnbaar niets meer te zien maar toch blijft hij zijn leven lang drager en zet op die manier de ziekte verder aan zijn nakomelingen. Dus denk driemaal na eer ge zulk een vogel inzet voor de kweek. Nog zo'n probleemvogel is de groenvink. Ze kweken gaat nogal, maar gezond en wel door de rui krijgen dat is andere koffie. Sedert enkele jaren doe ik het zo: wanneer de rui begint, maar liefst nog vroeger, geef ik om de week ESB3 (één week ESB3 aan 1gr de liter, één week zuiver water) en dat tot na de volledige rui. Dank zij dit systeem is de sterfte minimaal en heb ik groenvinken met een laagje vet op de buik wat vroeger niet het geval was. Deze methode heeft geen gevolgen voor de verdere kweek. Dat er zich nu reeds tentoonstellers gereed maken is een feit maar voor onze Europeanen nog wat te vroeg, toch zeker voor de jonge vogels die volledig moeten geruid zijn als ze voor de TT worden ingezet.

Noël